

莱阳市人民医院

新冠核酸检测采样注意事项

1. 在规定区域内按流程穿脱防护用品。
2. 规范采样流程，及时手卫生，做到“一人次一手消毒”。
3. 标本采集后用 1000mg/L 含氯消毒液对标本容器外表面进行擦拭或喷洒消毒，然后放入带有生物安全警示标识的专用标本自封袋中包装，并对自封袋外表面用 1000mg/L 含氯消毒液进行消毒，然后置于专用密闭转运箱，并对转运箱外表面用 1000mg/L 含氯消毒液消毒。
4. 外出及吃饭之前必须换下防护服，不得穿戴防护用品离开工作区域，在清洁或室外通风区域间隔就餐。
5. 每班次用 1000mg/L 含氯消毒液对地面、桌面、门把手等高频接触物体表面进行擦拭，作用 30 分钟后清水擦净。用 75%酒精对键盘、鼠标、空气消毒机等仪器设备进行擦拭消毒。每日至少 3 次，如遇污染随时消毒。
6. 每班次工作人员将医疗废物使用双层废物袋分层包扎，用 2000mg/L 含氯消毒液喷洒消毒。
7. 每班次用 2000mg/L 含氯消毒液对医疗废物桶进行擦拭，作用 30 分钟后清水擦净。